

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ЭВАМЕНОЛ® НАЗО**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование препарата:** ЭВАМЕНОЛ® НАЗО

**МНН или группировочное наименование:** Левоментол + Фенилсалицилат

**Лекарственная форма:** капли назальные

**Состав на 100 г**

*Действующие вещества:*

Левоментол - 1 г

Фенилсалицилат - 3 г

*Вспомогательное вещество:*

Парафин жидкий (вазелиновое масло) - 96 г

**Описание:** бесцветная маслянистая жидкость с запахом ментола.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** M02AX10

**Фармакологическое действие**

Антисептическое комбинированное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

При нанесении на кожные покровы ментол оказывает местнораздражающее, некоторое противомикробное и противовоспалительное действие, сопровождающееся уменьшением выраженности болевого синдрома и зуда. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные эффекты (рефлекторная дуга не затрагивает головной мозг) улучшают трофику тканей (соответственно зонам иннервации).

Фенилсалицилат – фениловый эфир салициловой кислоты, распадается на салициловую кислоту и фенол, которые оказывают слабое противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

### **Показания к применению**

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит). Препарат применяется для симптоматического лечения в комплексной терапии для облегчения носового дыхания.

### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет, бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с недостаточностью клинических данных).

### **Способ применения и дозы**

Местно (интраназально). Взрослым и детям с 6-ти лет по 2 капли в каждый носовой ход или в виде смазывания слизистой оболочки носовых ходов ватной палочкой, смоченной препаратом, 2-3 раза в день. При сохранении симптомов более 3-х дней необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции, контактный дерматит, бронхоспазм, появление жжения, чихания или усиление заложенности носа.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте.

Лечение: симптоматическое под контролем врача.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

В настоящее время данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

### **Особые указания**

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании препарата в глаза рекомендуется обильно промыть водой. При ухудшении состояния или сохранении симптомов более 5-10 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Не применять более 3-х дней, при необходимости применения более 3-х дней необходима консультация с врачом. Частое и длительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Капли назальные, 1 % + 3 %. По 8 мл, 12 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками пластмассовыми с пипетками или крышками со спрей-насадками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, Москва, Фармацевтический проезд, д. 1  
тел. (495) 956-05-71, факс (495) 459-41-12

**[www.mosfarma.ru](http://www.mosfarma.ru)**

Генеральный директор

М. Д. Дулькис

ЗАО «Московская

фармацевтическая фабрика»